

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica

Sistema de Informação da Atenção Básica

SIAB

Indicadores 2000

3.^a edição atualizada

Série G. Estatística e Informação em Saúde



Brasília – DF
2003

© 2000. Ministério da Saúde.

É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.

Série G. Estatística e Informação em Saúde.

Tiragem: 3.ª edição atualizada – 2003 – 3.500 exemplares

Elaboração, distribuição e informações:

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica
Coordenação de Acompanhamento e Avaliação
Esplanada dos Ministérios, bloco G, 7.º andar, sala 746
CEP: 70058-900, Brasília – DF
Tel.: (61) 315 3434 Fax: (61) 226 4340
E-mail: investiga.dab@saude.gov.br

Elaboração:

Eronildo Felisberto – Coordenação Geral
Celina Setsuko Kawano – Coordenação Técnica

Equipe técnica MS/SAS/DAB:

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| Auristela Lins | Celina Kawano | Cynthia Alves |
| Edneusa Nascimento | Gabriela Murakami | Maria Arindelita |
| Marina Mendes | | |

Equipe técnica Área de Informação e Informática do SUS (DATASUS/Cartão Nacional de Saúde):

Caetano Impallari
Júlia de Figueiredo Coelho

Consultores:

Maria Guadalupe Medina
Rosana Aquino
Paulo Frias

Técnicos de Informática:

Flávia Davide
Sávio Chaves
Tupinambá dos Santos

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Ficha Catalográfica

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Sistema de informação da atenção básica - SIAB: indicadores 2000 / Ministério da Saúde,
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 3. ed. atual. – Brasília:
Ministério da Saúde, 2003.

48 p.: il. color. – (Série G. Estatística e Informação em Saúde)

ISBN 85-334-0671-1

1. Sistema de Informação. 2. Serviços de Saúde. 3. Indicadores de Saúde. I. Brasil. Ministério da Saúde. II. Brasil. Secretaria de Atenção à Saúde. III. Departamento de Atenção Básica. IV. Título. V. Série.

NLM Z 699

Catalogação na fonte – Editora MS

EDITORA MS
Documentação e Informação
SIA, Trecho 4, Lotes 540/610
CEP: 71200-040, Brasília – DF
Tels.: (61) 233 1774/2020 Fax: (61) 233 9558
E-mail: editora.ms@saude.gov.br

Sumário

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lista de Gráficos e Tabelas..... | 5 |
| Apresentação..... | 9 |
| Prefácio..... | 11 |
| O Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB..... | 13 |
| Cobertura da Estratégia Saúde da Família..... | 15 |
| Dados Referentes a Cadastramento Familiar..... | 18 |
| Indicadores Sociais e Demográficos..... | 19 |
| Situação de Saúde..... | 23 |
| Atenção à Saúde de Grupos de Risco – Menores de 2 Anos..... | 35 |
| Atenção à Saúde de Grupos de Risco – Gestantes..... | 41 |
| Atenção à Saúde de Grupos de Risco – Acompanhamento de Problemas de Saúde Prioritários | 43 |
| Acompanhamento de Hospitalizações..... | 45 |

Lista de Gráficos e Tabelas

Gráficos

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Evolução do número de agentes comunitários de saúde, Brasil – 1994/2000..... | 16 |
| Evolução do número de equipes de saúde da família, Brasil – 1994/2000..... | 16 |
| Incidência de baixo peso ao nascer nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000..... | 24 |
| Prevalência de desnutrição protéico-calórica em crianças menores de 1 ano nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000..... | 24 |
| Prevalência de desnutrição protéico-calórica em crianças de 12 a 23 meses nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000..... | 24 |
| Prevalência de diarreia em menores de 2 anos nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000..... | 26 |
| Prevalência de IRA em menores de 2 anos nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000..... | 26 |
| Taxa de mortalidade infantil global por diarreia, por IRA e por outras causas em áreas cobertas pelo PACS, Brasil e regiões, 2000..... | 28 |
| Taxa de mortalidade infantil global por diarreia, por IRA e por outras causas em áreas cobertas pelo PSF, Brasil e regiões, 2000..... | 28 |
| Mortalidade infantil proporcional por diarreia, por IRA e por outras causas nas áreas cobertas pelo PACS, Brasil e regiões, 2000..... | 30 |
| Mortalidade infantil proporcional por diarreia, por IRA e por outras causas nas áreas cobertas pelo PSF, Brasil e regiões, 2000..... | 30 |
| Mortalidade infantil proporcional neonatal e pós-neonatal nas áreas cobertas pelo PACS, Brasil e regiões, 2000..... | 32 |
| Mortalidade infantil proporcional neonatal e pós-neonatal nas áreas cobertas pelo PSF, Brasil e regiões, 2000..... | 32 |
| Mortalidade proporcional de adolescentes (10 a 19 anos) por violência nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000..... | 34 |
| Mortalidade proporcional de mulheres (10 a 49 anos) nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000..... | 34 |
| Proporção de crianças até 4 meses com aleitamento materno exclusivo nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000..... | 36 |
| Proporção de crianças menores de 2 anos que tiveram diarreia e usaram terapia de hidratação/reidratação oral, nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000..... | 36 |
| Proporção de nascidos vivos pesados ao nascer nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000..... | 38 |
| Proporção de crianças menores de 1 ano pesadas pelos ACS nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000..... | 38 |
| Proporção de crianças de 12 a 23 meses pesadas pelos ACS nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000..... | 38 |
| Proporção de crianças menores de 1 ano com esquema vacinal básico em dia nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000..... | 40 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Proporção de crianças de 12 a 23 meses com esquema vacinal básico em dia nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000. | 40 |
| Proporção de gestantes com consulta de pré-natal no mês nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000. | 42 |
| Proporção de gestantes com início do pré-natal no primeiro trimestre nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000. | 42 |
| Proporção de gestantes com vacina em dia nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000. | 42 |
| Proporção de portadores de hipertensão arterial acompanhados nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000. | 43 |
| Proporção de portadores de diabetes <i>mellitus</i> acompanhados nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000. | 44 |
| Proporção de portadores de hanseníase acompanhados nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000. | 44 |
| Proporção de portadores de tuberculose acompanhados nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000. | 44 |
| Proporção de hospitalizações de menores de 5 anos por pneumonia, nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000. | 45 |
| Proporção de hospitalizações de menores de 5 anos por desidratação, nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000. | 46 |
| Proporção de hospitalizações por complicações de diabetes <i>mellitus</i> nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000. | 46 |
| Proporção de hospitalizações por abuso de álcool nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000. | 47 |
| Proporção de hospitalizações por outras causas nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000. | 47 |

Tabelas

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| População coberta pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000. | 15 |
| Municípios com informações, famílias cadastradas e pessoas por faixa etária em áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000. | 18 |
| Indicadores sociais e demográficos da população coberta pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000. | 19 |
| Incidência de baixo peso ao nascer e prevalência de desnutrição protéico-calórica em crianças menores de 1 ano e de 12 a 23 meses nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000. | 23 |
| Prevalência de diarreia e IRA em menores de 2 anos nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000. | 25 |
| Taxa de mortalidade infantil global por diarreia, por IRA e por outras causas em áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000. | 27 |
| Mortalidade infantil proporcional por diarreia, por IRA e por outras causas em áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000. | 29 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Mortalidade infantil proporcional neonatal e pós-neonatal nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000..... | 31 |
| Mortalidade proporcional de adolescentes (10 a 19 anos) por violência e de mulheres (10 a 49 anos) nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil, 2000. | 33 |
| Proporção de crianças até 4 meses com aleitamento materno exclusivo e crianças menores de 2 anos que tiveram diarreia e usaram terapia de hidratação/reidratação oral nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000..... | 35 |
| Proporção de nascidos vivos pesados ao nascer, de crianças menores de 1 ano e de 12 a 23 meses pesadas pelos agentes comunitários de saúde (ACS) nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000. | 37 |
| Proporção de crianças menores de 1 ano e de 12 a 23 meses com esquema vacinal básico em dia nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000..... | 39 |
| Proporção de gestantes com consultas pré-natal no mês, com início do pré-natal no primeiro trimestre e com vacina em dia nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000..... | 41 |
| Proporção de portadores de hipertensão arterial, diabetes <i>mellitus</i> , tuberculose e hanseníase acompanhados nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000..... | 43 |
| Proporção de hospitalizações por pneumonia e desidratação em menores de 5 anos, por complicações de diabetes <i>mellitus</i> , abuso de álcool e outras causas nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000..... | 45 |

Apresentação

Muito se tem discutido em nosso País acerca da multiplicidade dos sistemas de informações em saúde, bem como sobre os investimentos em recursos humanos e materiais para alimentar grandes massas de dados que, muitas vezes, são questionados quanto à qualidade e ao uso. Nesse contexto, fomentar mecanismos de utilização das informações rotineiramente produzidas nos serviços de saúde contribui para aperfeiçoar processos de melhoria da qualidade da própria informação e orientar a gestão do sistema de saúde.

Nesta oportunidade, o Ministério da Saúde apresenta, em três fascículos, as informações produzidas pelo Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) referentes aos anos de 2000, 2001 e 2002, resgatando o compromisso da gestão federal com a divulgação das informações de saúde.

O principal propósito da apresentação desses indicadores é o de contribuir para a institucionalização da avaliação da atenção básica em todas as instâncias gestoras do SUS, destacando o papel que tem as informações provenientes dos sistemas de informação para monitorar os efeitos dos serviços e programas sobre a situação de saúde da população.

Criado para ser utilizado como ferramenta de planejamento e gestão das equipes de saúde da família e de agentes comunitários de saúde, o SIAB possui um amplo elenco de indicadores que permitem a caracterização da situação sociossanitária, do perfil epidemiológico e o acompanhamento das ações de saúde desenvolvidas. Vale destacar que o SIAB disponibiliza indicadores sociais, permitindo aos gestores municipais monitorar condições sociodemográficas das áreas cobertas, que só estão disponíveis nesse nível de desagregação nos anos censitários.

Com relação ao nível de desagregação das informações do sistema, ressalta-se ainda que, adotando soluções tecnológicas bem simplificadas, o SIAB operacionaliza o conceito de território como processo social em construção, enquanto instrumento que possibilita a microlocalização de problemas e o desvelamento das desigualdades sociais e de saúde no espaço das cidades, permitindo gestões mais equânimes.

Jorge José Santos Pereira Solla
Secretário de Atenção à Saúde

Prefácio

O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) foi criado em 1998 como instrumento gerencial dos Sistemas Locais de Saúde. Caracteriza-se por descrever a realidade socioeconômica, sinalizar a situação de adoecimento e morte da população, avaliar a adequação dos serviços e ações de saúde, além de contribuir para o monitoramento da situação em áreas geográficas definidas.

Entre os diversos Sistemas de Informação em Saúde, é o sistema que trabalha com o nível de desagregação por microáreas, sendo reconhecido por sua agilidade e capacidade de contribuir na explicitação de situações de saúde e na prestação de serviços.

A presente série de publicações – Sistema de Informações da Atenção Básica – indicadores dos anos 2000, 2001 e 2002, resgata a necessidade de divulgação de informações do sistema e traduz o compromisso desta gestão em consolidar e publicizar a estratégia Saúde da Família como política pública prioritária.

As informações ora divulgadas mantêm os mesmos indicadores e nível de desagregação utilizado na primeira publicação referente aos dados de 1999. Neste número também é descrito todo o processo de revisão e crítica aos dados, que objetivou conferir maior confiabilidade e consistência ao banco de dados do SIAB. Optou-se, a exemplo da primeira publicação, por excluir os municípios que não informaram todos os meses do ano.

Esperamos com esta publicação estar estimulando profissionais, gerentes e gestores do Sistema Único de Saúde a utilizar o SIAB como uma ferramenta de planejamento e gestão. Por outro lado, favorecer o processo de institucionalização do monitoramento e avaliação da situação de saúde e da prestação dos serviços de saúde.

Afra Suassuna Fernandes

Diretora do Departamento de Atenção Básica

Eronildo Felisberto

Coordenador de Acompanhamento e Avaliação da Atenção Básica

O Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB

O SIAB é um sistema de informação territorializado cujos dados são gerados por profissionais de saúde das equipes da estratégia Saúde da Família. As informações são coletadas em âmbito domiciliar e em unidades básicas nas áreas cobertas pelos programas Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde. O fato da coleta de dados se referir a populações bem delimitadas possibilita a construção de indicadores populacionais referentes às áreas de abrangência dos programas, que podem ser agregadas em diversos níveis: a microárea do agente comunitário de saúde, que corresponde a um território onde residem de 100 a 150 famílias; a área da equipe de saúde da família, cuja população é de cerca de 1.000 famílias; um ou vários segmentos territoriais de um município; um município; estado; região e país. A territorialização do sistema possibilita, ainda, a localização espacial de problemas de saúde e a identificação de desigualdades, constituindo-se em ferramenta importante para a implementação de políticas de redução de iniquidades, favorecendo, também, a avaliação da efetividade das ações desenvolvidas pelos serviços de saúde.

Os principais instrumentos de coleta do SIAB são:

- Ficha de cadastro das famílias e levantamento de dados socio sanitários, preenchida pelo agente comunitário de saúde (ACS) no momento do cadastramento das famílias, sendo atualizada permanentemente.
- Fichas de acompanhamento de grupos de risco e de problemas de saúde prioritários, preenchidas mensalmente pelos agentes comunitários de saúde, no momento de realização das visitas domiciliares.
- Fichas de registro de atividades, procedimentos e notificações, produzidas mensalmente por todos os profissionais das equipes de saúde.

Os dados gerados por meio das fichas de coleta são, em grande parte, agregados e alguns deles são consolidados antes de serem lançados no programa informatizado. Uma vez processados os dados, são produzidos os relatórios de indicadores do SIAB. São eles:

- Consolidado de famílias cadastradas – apresenta os indicadores demográficos e socio sanitários por microárea, área, segmento territorial, zona (urbana/rural), município, estado e região.
- Relatório de Situação de Saúde e Acompanhamento das Famílias – que consolida mensalmente as informações sobre situação de saúde das famílias acompanhadas por área, segmento territorial, zona (urbana/rural), município, estado e região.
- Relatório de produção e marcadores para avaliação – que consolida mensalmente as informações sobre produção de serviços e a ocorrência de doenças e/ou situações consideradas como marcadoras por área, segmento territorial, zona (urbana/rural), município, estado e região.

A agregação dos dados confere grande agilidade ao sistema, gerando uma informação oportuna no processo de decisão em saúde. Aliada a essa característica, o grande nível de desagregação favorece sua utilização enquanto instrumento de planejamento e gestão local. Os seus limites estão relacionados, principalmente, à realização de análises que requerem a individualização de dados e às restrições relacionadas ao fato de só abranger unidades básicas de saúde onde atuam equipes de saúde da família. Além disso, alguns problemas de natureza tecnológica do sistema informatizado têm sido apontados. Buscando dar conta dessas limitações, encontra-se em curso um processo de reformulação do sistema, cuja implementação se fará em consonância com o processo de revisão da política de informação e informática que vem sendo gestada no Ministério da Saúde, articulada a outros processos de reformulação de sistemas de saúde no âmbito do SUS.

Esta publicação apresenta os resultados da análise dos indicadores do SIAB referentes a municípios que informaram ao sistema todos os meses do ano, cujas bases encontravam-se livres de erros e inconsistências após aplicação de uma criteriosa rotina de limpeza de dados. Essa rotina se baseou na definição de critérios, a partir dos quais se definiu pela inclusão ou exclusão do município na base de dados para análise – “base limpa”. Foram definidos critérios de verificação de erros e inconsistências, tanto para a base de dados de

cadastro quanto para a base de dados de situação de saúde. Ainda não foram definidos critérios para limpeza da base de dados de produção, sendo esta a razão pela qual tais informações não constam desta publicação.

Após aplicação das rotinas de limpeza, obtiveram-se duas “bases limpas”: a base de cadastro e a base de situação de saúde. A “base limpa” de cadastro exclui os municípios com erros ou inconsistências relacionados a qualquer um dos critérios considerados. A “base limpa” de situação de saúde inclui ou exclui o município com relação a cada um dos indicadores analisados. Vale ressaltar que, como as rotinas são independentes, a exclusão de um município de uma das bases não implica na sua exclusão da outra base.

Os principais critérios de exclusão para limpeza da base, relacionados ao cadastro, foram: número de famílias cadastradas menor que 100; número de pessoas cadastradas menor que 350; média de pessoas por família maior que 8,0 ou menor que 2,0; ausência de pessoas cadastradas em alguma das faixas etárias; razão de sexos menor que 0,5 ou maior que 2,0 e diferença entre número de pessoas cadastradas e somatório do número de pessoas por faixa etária maior que 10%. Os principais critérios de exclusão para limpeza da base, relacionados aos dados de situação de saúde, foram: taxa de mortalidade infantil maior que 1.000 óbitos por 1.000 nascidos vivos; proporção de pessoas acompanhadas nos grupos (gestantes, hipertensos, diabéticos, portadores de tuberculose e hanseníase) menor que 10%; ausência de dados de famílias cadastradas no relatório de situação de saúde; média de visitas por família maior que 4,0 ou menor que 0,2.

Cobertura da Estratégia Saúde da Família

População coberta pelo PACS/PSF*, por estado e região, Brasil, 2000.

| Estados | Modelo PACS | | | Modelo PSF | | | Total PACS/PSF | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | População residente | População acompanhada | Cobertura da população % | Nº Equipes de saúde da família | População acompanhada | Cobertura da população % | Nº agentes comunitários de saúde | População acompanhada | Cobertura da população % |
| RONDÔNIA | 1.296.856 | 789.475 | 60,9 | 103 | 355.350 | 27,4 | 1.991 | 1.144.825 | 88,3 |
| ACERE | 527.937 | 236.900 | 44,9 | 66 | 227.700 | 43,1 | 808 | 464.600 | 88,0 |
| AMAZONAS | 2.580.860 | 2.470.200 | 95,7 | 63 | 217.350 | 8,4 | 4.674 | 2.687.550 | 104,1 |
| RORAIMA | 266.922 | 104.650 | 39,2 | 14 | 48.300 | 18,1 | 266 | 152.950 | 57,3 |
| PARÁ | 5.896.420 | 4.303.875 | 73,0 | 192 | 662.400 | 11,2 | 8.637 | 4.966.275 | 84,2 |
| AMAPÁ | 439.781 | 443.325 | 100,8 | 11 | 37.950 | 8,6 | 837 | 481.275 | 109,4 |
| TOCANTINS | 1.134.895 | 1.034.425 | 91,1 | 118 | 407.100 | 35,9 | 2.507 | 1.441.525 | 127,0 |
| Região Norte | 12.143.671 | 9.382.850 | 77,3 | 567 | 1.956.150 | 16,1 | 19.720 | 11.339.000 | 93,4 |
| MARANHÃO | 5.418.349 | 4.216.475 | 77,8 | 128 | 441.600 | 8,2 | 8.101 | 4.658.075 | 86,0 |
| PIAUI | 2.734.170 | 1.286.850 | 47,1 | 413 | 1.424.850 | 52,1 | 4.716 | 2.711.700 | 99,2 |
| CEARÁ | 7.106.605 | 2.921.575 | 41,1 | 782 | 2.697.900 | 38,0 | 9.773 | 5.619.475 | 79,1 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 2.654.501 | 1.826.775 | 68,8 | 176 | 607.200 | 22,9 | 4.233 | 2.433.975 | 91,7 |
| PARAÍBA | 3.375.609 | 1.810.675 | 53,6 | 324 | 1.117.800 | 33,1 | 5.093 | 2.928.475 | 86,8 |
| PERNAMBUCO | 7.580.826 | 3.423.550 | 45,2 | 779 | 2.687.550 | 35,5 | 10.628 | 6.111.100 | 80,6 |
| ALAGOAS | 2.713.203 | 579.600 | 21,4 | 446 | 1.538.700 | 56,7 | 3.684 | 2.118.300 | 78,1 |
| SERGIPE | 1.712.786 | 672.750 | 39,3 | 212 | 731.400 | 42,7 | 2.442 | 1.404.150 | 82,0 |
| BAHIA | 12.993.011 | 8.672.725 | 66,7 | 249 | 859.050 | 6,6 | 16.577 | 9.531.775 | 73,4 |
| Região Nordeste | 46.289.060 | 25.410.975 | 54,9 | 3.509 | 12.106.050 | 26,2 | 65.247 | 37.517.025 | 81,0 |
| MINAS GERAIS | 17.295.955 | 2.459.275 | 14,2 | 1.155 | 3.984.750 | 23,0 | 11.207 | 6.444.025 | 37,3 |
| ESPÍRITO SANTO | 2.938.062 | 957.375 | 32,6 | 167 | 576.150 | 19,6 | 2.667 | 1.533.525 | 52,2 |
| RIO DE JANEIRO | 13.807.358 | 563.500 | 4,1 | 393 | 1.355.850 | 9,8 | 3.338 | 1.919.350 | 13,9 |
| SÃO PAULO | 35.816.740 | 1.379.425 | 3,9 | 828 | 2.856.600 | 8,0 | 7.367 | 4.236.025 | 11,8 |
| Região Sudeste | 69.858.115 | 5.359.575 | 7,7 | 2.543 | 8.773.350 | 12,6 | 24.579 | 14.132.925 | 20,2 |
| PARANÁ | 9.375.592 | 1.670.375 | 17,8 | 644 | 2.221.800 | 23,7 | 6.769 | 3.892.175 | 41,5 |
| SANTA CATARINA | 5.098.448 | 1.273.625 | 25,0 | 381 | 1.314.450 | 25,8 | 4.501 | 2.588.075 | 50,8 |
| RIO GRANDE DO SUL | 9.971.910 | 1.658.300 | 16,6 | 206 | 710.700 | 7,1 | 4.120 | 2.369.000 | 23,8 |
| Região Sul | 24.445.950 | 4.602.300 | 18,8 | 1.231 | 4.246.950 | 17,4 | 15.390 | 8.849.250 | 36,2 |
| MATO GROSSO DO SUL | 2.026.600 | 728.525 | 35,9 | 79 | 272.550 | 13,4 | 1.741 | 1.001.075 | 49,4 |
| MATO GROSSO | 2.375.190 | 813.050 | 34,2 | 147 | 507.150 | 21,4 | 2.296 | 1.320.200 | 55,6 |
| GOIÁS | 4.848.725 | 1.426.000 | 29,4 | 367 | 1.266.150 | 26,1 | 4.682 | 2.692.150 | 55,5 |
| DISTRITO FEDERAL | 1.969.868 | 148.350 | 7,5 | 60 | 207.000 | 10,5 | 618 | 355.350 | 18,0 |
| Região Centro-Oeste | 11.220.383 | 3.115.925 | 27,8 | 653 | 2.252.850 | 20,1 | 9.337 | 5.368.775 | 47,8 |
| Brasil | 163.957.179 | 47.871.625 | 29,2 | 8.503 | 29.335.350 | 17,9 | 134.273 | 77.206.975 | 47,1 |

Fonte: Sistema de captação de dados para pagamento (CAPSI) / IBGE


* Cobertura populacional estimada utilizando parâmetros de 575 pessoas cobertas para cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) e 3.450 pessoas cobertas para cada Equipe de Saúde da Família (ESF).

Municípios com a Estratégia Saúde da Família Brasil, 2000.




Municípios com Agentes Comunitários de Saúde
5.507 Municípios
134.273 Agentes

Evolução do número de agentes comunitários de saúde, Brasil – 1994/2000.




Fonte: SIAB.



Municípios com Equipes de Saúde da Família
5.507 Municípios
8.503 Equipes

Evolução do número de equipes de saúde da família, Brasil – 1994/2000.




Fonte: SIAB.

Proporção da População Coberta pela Estratégia Saúde da Família Brasil, 2000*.

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE


Proporção da População Coberta (%)



* Cobertura populacional estimada utilizando parâmetros de 575 pessoas cobertas por cada ACS.

EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Proporção da População Coberta (%)



* Cobertura populacional estimada utilizando parâmetros de 3.450 pessoas cobertas por cada ESF.

Fonte: SIAB.

Dados Referentes a Cadastramento Familiar

Municípios com informações, famílias cadastradas e pessoas por faixa etária em áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000.

| Estados | Nº de municípios com informações | Nº de famílias cadastradas | Número de pessoas por faixa etária | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| | | | < 1 ano | 1 - 4 anos | 5 - 6 anos | 7 - 9 anos | 10 - 14 anos | 15 - 19 anos | 20 - 39 anos | 40 - 49 anos | 50 - 59 anos | 60 anos e + | | |
| Rondônia | 44 | 144.572 | 2.473 | 47.393 | 31.866 | 47.276 | 76.990 | 73.035 | 211.833 | 64.638 | 37.496 | 37.193 | | |
| Acre | 16 | 72.346 | 1.678 | 28.493 | 17.156 | 23.348 | 36.446 | 35.253 | 98.148 | 25.637 | 15.962 | 18.447 | | |
| Amazonas | 54 | 323.682 | 11.440 | 175.815 | 101.701 | 140.665 | 208.279 | 200.630 | 529.734 | 139.247 | 79.809 | 90.493 | | |
| Roraima | 10 | 31.495 | 1.497 | 18.798 | 9.560 | 13.593 | 20.144 | 18.982 | 54.390 | 15.040 | 8.451 | 7.142 | | |
| Pará | 128 | 712.238 | 18.413 | 306.355 | 202.216 | 289.241 | 459.909 | 432.607 | 1.116.724 | 312.989 | 198.987 | 235.191 | | |
| Amapá | 13 | 84.258 | 8.898 | 44.477 | 28.876 | 44.477 | 49.388 | 47.791 | 120.357 | 35.282 | 18.257 | 16.990 | | |
| Tocantins | 121 | 248.744 | 14.114 | 89.426 | 49.550 | 71.768 | 118.157 | 111.717 | 308.963 | 94.838 | 62.018 | 70.917 | | |
| Região Norte | 386 | 1.617.335 | 58.513 | 710.757 | 440.925 | 620.483 | 969.313 | 920.015 | 2.440.149 | 687.671 | 420.980 | 476.373 | | |
| Maranhão | 172 | 717.580 | 22.701 | 314.395 | 187.539 | 272.196 | 460.570 | 447.988 | 1.030.436 | 306.039 | 213.752 | 302.878 | | |
| Piauí | 188 | 492.864 | 14.079 | 159.307 | 95.637 | 138.039 | 251.451 | 248.886 | 621.417 | 195.128 | 140.316 | 186.905 | | |
| Ceará | 155 | 977.920 | 28.295 | 324.772 | 202.866 | 294.112 | 500.653 | 456.080 | 1.208.114 | 367.867 | 301.508 | 460.109 | | |
| Rio Grande do Norte | 141 | 395.390 | 9.167 | 123.721 | 76.313 | 111.568 | 190.406 | 186.508 | 533.889 | 161.082 | 114.744 | 165.923 | | |
| Parabíba | 205 | 563.751 | 13.152 | 154.166 | 96.514 | 143.442 | 253.001 | 248.070 | 657.812 | 203.042 | 157.899 | 266.629 | | |
| Pernambuco | 180 | 1.262.057 | 47.443 | 435.441 | 261.324 | 374.524 | 626.683 | 616.500 | 1.743.691 | 530.376 | 381.030 | 496.797 | | |
| Alagoas | 92 | 424.278 | 15.993 | 170.382 | 103.977 | 146.189 | 237.784 | 226.650 | 585.410 | 169.214 | 119.914 | 151.147 | | |
| Sergipe | 65 | 346.189 | 10.120 | 123.658 | 74.778 | 105.797 | 171.797 | 169.458 | 495.126 | 139.818 | 92.440 | 119.122 | | |
| Bahia | 393 | 1.876.707 | 49.548 | 600.774 | 375.206 | 559.693 | 953.696 | 982.578 | 2.499.788 | 757.614 | 537.041 | 755.524 | | |
| Região Nordeste | 1.591 | 7.046.736 | 210.498 | 2.406.616 | 1.474.154 | 2.145.560 | 3.646.041 | 3.582.718 | 9.375.683 | 2.830.180 | 2.058.644 | 2.905.034 | | |
| Minas Gerais | 449 | 1.068.401 | 33.890 | 389.756 | 230.204 | 340.466 | 573.203 | 573.833 | 1.793.987 | 630.293 | 406.108 | 502.788 | | |
| Espírito Santo | 67 | 306.268 | 10.704 | 93.738 | 53.451 | 79.174 | 138.153 | 140.670 | 437.163 | 153.967 | 95.485 | 119.471 | | |
| Rio de Janeiro | 78 | 361.344 | 14.395 | 128.062 | 71.116 | 101.641 | 161.808 | 159.459 | 553.944 | 200.650 | 130.957 | 149.981 | | |
| São Paulo | 325 | 912.999 | 45.368 | 318.742 | 173.159 | 251.978 | 414.250 | 411.222 | 1.376.650 | 481.654 | 303.781 | 330.092 | | |
| Região Sudeste | 919 | 2.649.012 | 104.357 | 930.298 | 527.930 | 773.259 | 1.287.414 | 1.285.184 | 4.161.744 | 1.466.564 | 936.331 | 1.102.332 | | |
| Paraná | 285 | 910.411 | 40.228 | 304.219 | 168.960 | 247.696 | 401.097 | 387.944 | 1.264.675 | 445.296 | 307.037 | 364.838 | | |
| Santa Catarina | 182 | 542.101 | 17.466 | 152.718 | 85.862 | 129.257 | 218.174 | 211.820 | 699.932 | 284.204 | 168.515 | 182.488 | | |
| Rio Grande do Sul | 307 | 660.764 | 15.967 | 159.763 | 95.587 | 142.274 | 232.571 | 226.053 | 707.505 | 297.154 | 208.361 | 250.700 | | |
| Região Sul | 774 | 2.113.276 | 73.661 | 616.700 | 350.409 | 519.227 | 851.842 | 825.817 | 2.672.112 | 1.006.654 | 683.913 | 798.026 | | |
| Mato Grosso do Sul | 58 | 262.596 | 8.566 | 88.533 | 49.992 | 75.481 | 122.857 | 118.616 | 368.278 | 123.914 | 76.341 | 88.656 | | |
| Mato Grosso | 107 | 294.061 | 11.697 | 101.039 | 60.121 | 87.875 | 143.945 | 135.253 | 429.187 | 134.722 | 79.790 | 79.829 | | |
| Goiás | 138 | 469.930 | 11.458 | 132.052 | 79.411 | 115.760 | 190.340 | 186.861 | 628.914 | 204.382 | 128.949 | 208.408 | | |
| Distrito Federal | 1 | 106.964 | 1.742 | 45.314 | 36.697 | 57.503 | 55.627 | 183.664 | 51.648 | 27.634 | 22.355 | | | |
| Região Centro-oeste | 304 | 1.133.551 | 33.463 | 363.938 | 215.285 | 315.813 | 514.645 | 496.357 | 1.610.043 | 514.666 | 312.714 | 399.248 | | |
| Brasil | 3.974 | 14.559.910 | 480.492 | 5.028.309 | 3.008.703 | 4.374.342 | 7.269.255 | 7.110.091 | 20.259.731 | 6.505.735 | 4.412.582 | 5.681.013 | | |

Fonte: SIAB - Base limpa.

Indicadores Sociais e Demográficos

Indicadores sociais e demográficos da população coberta pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000.



| Estados | Razão de Sexos (%) (M/F) | Proporção de pessoas de 15 anos ou mais alfabetizadas (%) | Percentual dos domicílios com | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|
| | | | Abastecimento de água da rede | Algum tipo de tratamento de água no domicílio | Esgotamento sanitário da rede | Coleta pública de lixo | Construção de tijolo ou madeira | Energia elétrica |
| Rondônia | 126,3 | 86,9 | 27,2 | 76,3 | 4,3 | 45,3 | 95,9 | 73,7 |
| Acre | 109,5 | 78,2 | 38,1 | 69,6 | 14,2 | 53,5 | 95,2 | 83,6 |
| Amazonas | 131,5 | 88,3 | 57,8 | 41,6 | 16,4 | 62,0 | 89,4 | 81,0 |
| Roraima | 162,5 | 87,2 | 83,6 | 56,6 | 8,2 | 72,8 | 94,8 | 88,6 |
| Pará | 124,5 | 82,6 | 31,7 | 52,8 | 3,6 | 35,7 | 79,4 | 65,7 |
| Amapá | 107,0 | 78,1 | 50,2 | 72,3 | 4,5 | 56,5 | 84,4 | 80,6 |
| Tocantins | 104,7 | 75,9 | 66,0 | 72,7 | 1,4 | 58,1 | 82,9 | 68,7 |
| Região Norte | 122,5 | 82,8 | 44,1 | 57,6 | 6,5 | 47,9 | 84,7 | 72,0 |
| Maranhão | 125,7 | 70,0 | 41,4 | 55,4 | 4,6 | 21,5 | 45,5 | 69,4 |
| Piauí | 100,2 | 68,8 | 53,9 | 51,4 | 2,6 | 31,0 | 71,5 | 66,5 |
| Ceará | 104,6 | 69,6 | 44,0 | 77,3 | 8,4 | 40,3 | 79,6 | 73,8 |
| Rio Grande do Norte | 106,3 | 73,5 | 71,6 | 69,5 | 15,8 | 66,2 | 90,0 | 89,3 |
| Paraíba | 95,1 | 68,8 | 55,7 | 72,0 | 21,5 | 52,6 | 86,3 | 86,7 |
| Pernambuco | 111,2 | 70,9 | 63,2 | 71,6 | 27,6 | 56,4 | 88,9 | 88,7 |
| Alagoas | 104,4 | 62,7 | 57,3 | 57,4 | 10,8 | 56,0 | 78,9 | 83,4 |
| Sergipe | 106,2 | 75,0 | 72,3 | 55,0 | 21,4 | 61,5 | 82,8 | 89,1 |
| Bahia | 105,7 | 75,7 | 63,0 | 68,8 | 24,8 | 50,2 | 88,1 | 73,5 |
| Região Nordeste | 107,4 | 71,5 | 57,6 | 66,8 | 17,7 | 47,7 | 80,7 | 78,6 |
| Minas Gerais | 154,9 | 85,1 | 82,8 | 87,6 | 64,5 | 73,0 | 96,4 | 88,8 |
| Espírito Santo | 132,4 | 83,7 | 66,3 | 71,2 | 51,3 | 62,6 | 96,0 | 94,7 |
| Rio de Janeiro | 152,1 | 88,5 | 64,8 | 72,4 | 52,9 | 79,1 | 97,4 | 95,6 |
| São Paulo | 137,3 | 89,4 | 88,1 | 66,4 | 71,1 | 90,0 | 96,4 | 96,6 |
| Região Sudeste | 146,0 | 86,8 | 80,3 | 76,3 | 63,7 | 78,5 | 96,5 | 93,1 |
| Paraná | 125,7 | 87,7 | 75,7 | 44,5 | 26,6 | 80,5 | 93,3 | 94,3 |
| Santa Catarina | 114,6 | 92,1 | 68,3 | 41,0 | 26,5 | 76,3 | 85,7 | 96,3 |
| Rio Grande do Sul | 97,8 | 89,3 | 65,4 | 21,4 | 21,3 | 62,8 | 90,8 | 91,8 |
| Região Sul | 114,5 | 89,3 | 70,6 | 36,4 | 24,9 | 73,9 | 90,6 | 94,0 |
| Mato Grosso do Sul | 124,0 | 86,9 | 85,2 | 38,6 | 4,0 | 85,5 | 91,1 | 93,3 |
| Mato Grosso | 120,5 | 82,8 | 66,9 | 60,3 | 10,4 | 73,4 | 94,1 | 84,3 |
| Goiás | 124,9 | 84,0 | 64,7 | 80,6 | 14,6 | 72,7 | 94,8 | 91,5 |
| Distrito Federal | 121,2 | 91,9 | 83,8 | 93,3 | 79,3 | 90,9 | 97,3 | 96,9 |
| Região Centro-oeste | 123,1 | 85,1 | 71,8 | 66,8 | 17,2 | 77,6 | 94,0 | 90,6 |
| Brasil | 118,0 | 79,0 | 63,2 | 63,1 | 25,8 | 59,4 | 86,5 | 83,7 |

Fonte: SIAB - Base limpa.

Perfil Sociodemográfico da População Coberta pelo PACS/PSF Brasil, 2000.



Abastecimento de água

Proporção de domicílios com
abastecimento de água da rede (%)



Tratamento de água

Proporção de domicílios
com tratamento de água (%)





Fonte: SIAB.

Perfil Sociodemográfico da População Coberta pelo PACS/PSF

Brasil, 2000.



Coleta de lixo

Proporção de domicílios com coleta de lixo (%)



Rede de esgoto ou fossa séptica

Proporção de domicílios ligados a rede de esgoto ou fossa (%)





Fonte: SIAB.

Perfil Sociodemográfico da População Coberta pelo PACS/PSF

Brasil, 2000.



Material de construção do domicílio

Proporção de domicílios com construção de tijolo ou madeira (%)



Energia elétrica

Proporção de domicílios com energia elétrica (%)



Fonte: SIAB.


Situação de Saúde

Incidência de baixo peso ao nascer e prevalência de desnutrição protéico-calórica em crianças menores de 1 ano e de 12 a 23 meses nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000.

| Estados | PACS | | | PSF | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| | Baixo peso ao nascer (%) | Desnutrição em crianças < 1 ano (%) | Desnutrição em crianças de 12 a 23 meses (%) | Baixo peso ao nascer (%) | Desnutrição em crianças < 1 ano (%) | Desnutrição em crianças de 12 a 23 meses (%) |
| Rondônia | 7,4 | 4,0 | 7,3 | 6,1 | 4,8 | 11,1 |
| Acre | 7,6 | 9,4 | 23,7 | 7,9 | 11,0 | 22,1 |
| Amazonas | 13,9 | 12,7 | 13,8 | 9,4 | 6,2 | 11,7 |
| Roraima | 9,7 | 4,3 | 5,8 | 8,0 | 3,0 | 4,5 |
| Pará | 9,8 | 7,4 | 11,7 | 8,6 | 7,9 | 16,2 |
| Amapá | 5,6 | 4,4 | 5,8 | 8,2 | 3,9 | 6,5 |
| Tocantins | 6,0 | 6,6 | 13,9 | 7,2 | 5,8 | 13,7 |
| Região Norte | 9,8 | 7,7 | 11,7 | 7,9 | 6,5 | 13,8 |
| Maranhão | 7,4 | 11,4 | 23,0 | 8,2 | 10,7 | 23,5 |
| Piauí | 7,6 | 11,4 | 26,0 | 7,6 | 8,9 | 23,6 |
| Ceará | 6,1 | 6,9 | 16,6 | 6,5 | 6,9 | 19,3 |
| Rio Grande do Norte | 8,6 | 6,9 | 12,7 | 9,0 | 5,5 | 11,5 |
| Paraíba | 8,2 | 8,3 | 17,6 | 8,0 | 7,9 | 20,5 |
| Pernambuco | 8,5 | 11,7 | 19,9 | 8,2 | 8,8 | 18,4 |
| Alagoas | 7,1 | 16,4 | 26,9 | 7,1 | 14,2 | 25,5 |
| Sergipe | 7,9 | 5,3 | 13,2 | 7,6 | 6,8 | 16,9 |
| Bahia | 8,7 | 9,4 | 19,7 | 7,8 | 7,9 | 20,2 |
| Região Nordeste | 8,0 | 9,8 | 19,8 | 7,2 | 8,6 | 20,4 |
| Minas Gerais | 12,0 | 8,6 | 14,9 | 10,9 | 7,8 | 14,3 |
| Espírito Santo | 8,1 | 4,1 | 7,0 | 9,8 | 2,6 | 7,5 |
| Rio de Janeiro | 12,0 | 4,2 | 6,7 | 11,6 | 4,6 | 8,0 |
| São Paulo | 11,8 | 3,4 | 6,2 | 10,5 | 3,5 | 6,1 |
| Região Sudeste | 11,2 | 4,6 | 8,0 | 10,9 | 6,5 | 11,9 |
| Paraná | 12,3 | 5,5 | 9,2 | 11,5 | 5,1 | 9,6 |
| Santa Catarina | 11,7 | 4,4 | 5,9 | 11,2 | 5,2 | 10,0 |
| Rio Grande do Sul | 10,9 | 4,9 | 8,4 | 13,2 | 6,0 | 14,4 |
| Região Sul | 11,8 | 5,2 | 8,7 | 11,8 | 5,3 | 10,7 |
| Mato Grosso do Sul | 8,8 | 3,1 | 6,4 | 10,8 | 5,2 | 12,4 |
| Mato Grosso | 8,3 | 5,5 | 9,0 | 7,4 | 4,1 | 12,2 |
| Goiás | 8,4 | 4,6 | 9,1 | 6,7 | 6,3 | 9,4 |
| Distrito Federal | | | | 8,0 | 2,8 | 5,1 |
| Região Centro-Oeste | 8,5 | 4,4 | 8,1 | 7,5 | 5,2 | 9,4 |
| Brasil | 8,9 | 8,6 | 16,4 | 8,4 | 7,7 | 17,2 |


Fonte : SIAB - Base limpa.

Incidência de baixo peso ao nascer nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.




Fonte: SIAB - Base limpa.

Prevalência de desnutrição protéico-calórica em crianças menores de 1 ano nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.



Fonte: SIAB - Base limpa.

Prevalência de desnutrição protéico-calórica em crianças de 12 a 23 meses nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.




Fonte: SIAB - Base limpa.

Prevalência de diarreia e IRA em menores de 2 anos nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000.

| Estados | PACS | | PSF | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | Prevalência de diarreia (%) | Prevalência de IRA (%) | Prevalência de diarreia (%) | Prevalência de IRA (%) |
| Rondônia | 7,2 | 8,4 | 6,1 | 5,2 |
| Acre | 14,8 | 12,3 | 13,6 | 17,2 |
| Amazonas | 12,0 | 7,9 | 12,2 | 9,3 |
| Roraima | 6,8 | 4,0 | 5,5 | 4,7 |
| Pará | 10,7 | 10,5 | 9,1 | 9,8 |
| Amapá | 15,8 | 14,6 | 12,1 | 21,7 |
| Tocantins | 6,6 | 6,6 | 7,2 | 6,0 |
| Região Norte | 10,8 | 9,8 | 8,6 | 8,4 |
| Maranhão | 9,2 | 9,1 | 10,1 | 16,1 |
| Piauí | 8,7 | 7,3 | 9,7 | 11,1 |
| Ceará | 8,9 | 7,5 | 9,1 | 8,8 |
| Rio Grande do Norte | 9,3 | 11,9 | 10,3 | 16,3 |
| Paraíba | 9,4 | 10,6 | 9,9 | 14,3 |
| Pernambuco | 7,6 | 6,7 | 7,2 | 8,2 |
| Alagoas | 9,9 | 7,7 | 8,9 | 9,3 |
| Sergipe | 7,2 | 12,3 | 9,0 | 14,5 |
| Bahia | 7,1 | 6,4 | 6,5 | 5,8 |
| Região Nordeste | 8,1 | 7,9 | 8,8 | 9,7 |
| Minas Gerais | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,1 |
| Espírito Santo | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 11,5 |
| Rio de Janeiro | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 4,4 |
| São Paulo | 4,2 | 5,9 | 4,0 | 3,7 |
| Região Sudeste | 4,9 | 5,5 | 5,2 | 5,2 |
| Paraná | 6,2 | 4,7 | 6,5 | 5,9 |
| Santa Catarina | 4,7 | 3,9 | 5,3 | 5,3 |
| Rio Grande do Sul | 5,2 | 6,7 | 6,1 | 6,5 |
| Região Sul | 5,8 | 5,4 | 6,2 | 5,9 |
| Mato Grosso do Sul | 4,5 | 4,4 | 6,4 | 4,8 |
| Mato Grosso | 8,6 | 11,3 | 6,6 | 14,3 |
| Goiás | 6,6 | 6,4 | 6,7 | 7,4 |
| Distrito Federal | | | 3,4 | 2,6 |
| Região Centro-Oeste | 6,4 | 7,2 | 6,1 | 7,3 |
| Brasil | 8,2 | 7,9 | 7,7 | 8,2 |


Fonte: SIAB - Base limpa.

Prevalência de diarreia em menores de 2 anos nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.



Fonte: SIAB - Base limpa.

Prevalência de IRA em menores de 2 anos nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.




Fonte: SIAB - Base limpa.

Taxa de mortalidade infantil global por diarreia, por IRA e por outras causas em áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000.

| Estados | PACS | | | | PSF | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | TMI global (/1.000 NV) | TMI diarreia (/1.000 NV) | TMI IRA (/1.000 NV) | TMI outras causas (/1.000 NV) | TMI global (/1.000 NV) | TMI diarreia (/1.000 NV) | TMI IRA (/1.000 NV) | TMI outras causas (/1.000 NV) |
| Rondônia | 31,0 | 2,4 | 6,6 | 22,0 | 26,5 | 3,5 | 3,5 | 19,5 |
| Acre | 44,3 | 10,9 | 11,3 | 22,2 | 42,2 | 5,1 | 7,2 | 29,9 |
| Amazonas | 56,9 | 17,5 | 15,6 | 23,7 | 47,1 | 9,8 | 6,7 | 30,5 |
| Roraima | 28,7 | 3,4 | 4,5 | 20,8 | 28,6 | 8,8 | 5,5 | 14,3 |
| Pará | 32,2 | 5,8 | 5,0 | 21,4 | 32,6 | 6,7 | 4,3 | 21,5 |
| Amapá | 15,4 | 2,2 | 3,5 | 9,7 | 20,9 | | 7,0 | 13,9 |
| Tocantins | 33,8 | 4,2 | 4,5 | 25,1 | 24,0 | 2,1 | 3,5 | 18,4 |
| Região Norte | 36,4 | 7,7 | 7,2 | 21,5 | 30,4 | 4,9 | 4,5 | 21,0 |
| Maranhão | 43,2 | 9,8 | 4,7 | 28,7 | 49,3 | 6,9 | 5,2 | 37,2 |
| Piauí | 35,1 | 8,8 | 3,2 | 23,1 | 31,7 | 5,8 | 3,4 | 22,4 |
| Ceará | 28,5 | 5,8 | 3,9 | 18,8 | 28,7 | 4,2 | 3,1 | 21,4 |
| Rio Grande do Norte | 31,6 | 5,3 | 3,7 | 22,6 | 31,6 | 7,1 | 4,4 | 20,0 |
| Paraíba | 38,4 | 6,8 | 4,2 | 27,4 | 32,7 | 3,0 | 1,5 | 28,2 |
| Pernambuco | 37,0 | 6,5 | 5,2 | 25,4 | 33,2 | 4,6 | 2,7 | 26,0 |
| Alagoas | 51,8 | 11,5 | 5,2 | 35,2 | 47,1 | 7,6 | 5,0 | 34,5 |
| Sergipe | 34,0 | 4,9 | 4,5 | 24,6 | 38,2 | 5,8 | 4,8 | 27,6 |
| Bahia | 43,2 | 6,6 | 5,9 | 30,7 | 34,1 | 4,8 | 3,9 | 25,4 |
| Região Nordeste | 39,4 | 7,2 | 4,9 | 27,3 | 33,9 | 5,2 | 3,6 | 25,2 |
| Minas Gerais | 40,3 | 4,2 | 4,0 | 32,2 | 31,6 | 4,2 | 3,7 | 23,7 |
| Espírito Santo | 43,6 | 7,8 | 5,8 | 30,0 | 31,2 | 3,9 | 4,1 | 23,2 |
| Rio de Janeiro | 32,1 | 2,0 | 5,7 | 24,4 | 33,2 | 2,2 | 5,7 | 25,3 |
| São Paulo | 26,5 | 2,8 | 3,5 | 20,2 | 19,4 | 0,5 | 2,3 | 16,7 |
| Região Sudeste | 33,7 | 3,9 | 4,5 | 25,3 | 29,8 | 3,4 | 3,7 | 22,7 |
| Paraná | 31,1 | 2,8 | 4,8 | 23,5 | 28,5 | 2,4 | 3,2 | 23,0 |
| Santa Catarina | 30,5 | 3,1 | 5,0 | 22,4 | 15,7 | 1,0 | 3,1 | 11,5 |
| Rio Grande do Sul | 28,0 | 3,2 | 4,0 | 20,8 | 22,9 | 2,2 | 2,7 | 17,9 |
| Região Sul | 30,1 | 2,9 | 4,6 | 22,6 | 24,7 | 2,1 | 3,1 | 19,5 |
| Mato Grosso do Sul | 27,8 | 3,3 | 3,7 | 20,9 | 23,9 | 5,6 | 4,0 | 14,3 |
| Mato Grosso | 24,1 | 2,0 | 3,8 | 18,4 | 26,3 | 5,4 | 1,6 | 19,3 |
| Goiás | 31,4 | 4,6 | 5,6 | 21,2 | 23,1 | 1,1 | 3,3 | 18,7 |
| Distrito Federal | | | | | 14,4 | 1,0 | 2,5 | 10,9 |
| Região Centro-Oeste | 27,5 | 3,2 | 4,3 | 20,1 | 22,0 | 2,5 | 2,9 | 16,6 |
| Brasil | 37,1 | 6,5 | 5,2 | 25,3 | 31,7 | 4,4 | 3,6 | 23,6 |


Fonte: SIAB - Base limpa.

Taxa de mortalidade infantil global por diarreia, por IRA e por outras causas em áreas cobertas pelo PACS, Brasil e regiões, 2000.



Fonte: SIAB - Base limpa.

Taxa de mortalidade infantil global por diarreia, por IRA e por outras causas em áreas cobertas pelo PSF, Brasil e regiões, 2000.



Fonte: SIAB - Base limpa.


Mortalidade infantil proporcional por diarreia, por IRA e por outras causas* em áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000.

| Estados | PACS | | | | PSF | | | |
|----------------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|
| | MIP (%) | MIP diarreia (%) | MIP IRA (%) | MIP outras causas (%) | MIP (%) | MIP diarreia (%) | MIP IRA (%) | MIP outras causas (%) |
| Rondônia | 22,5 | 7,7 | 19,0 | 71,0 | 14,5 | 10,5 | 10,5 | 78,9 |
| Acre | 28,4 | 24,5 | 26,9 | 50,0 | 25,3 | 12,5 | 25,0 | 62,5 |
| Amazonas | 47,8 | 30,8 | 27,5 | 41,7 | 32,9 | 20,9 | 14,3 | 64,8 |
| Roraima | 23,4 | 11,8 | | 72,5 | | | | |
| Pará | 23,8 | 18,1 | 15,0 | 66,5 | 18,4 | 20,5 | 14,6 | 64,9 |
| Amapá | 14,6 | 14,5 | 22,9 | 62,7 | 16,4 | | 33,3 | 66,7 |
| Tocantins | 18,1 | 12,4 | 13,3 | 74,3 | 13,6 | 8,8 | 14,6 | 76,6 |
| Região Norte | 27,0 | 21,2 | 20,2 | 59,0 | 17,7 | 15,4 | 15,2 | 69,3 |
| Maranhão | 22,5 | 22,8 | 10,8 | 66,4 | 20,2 | 16,4 | 9,1 | 74,5 |
| Piauí | 15,7 | 25,1 | 9,6 | 65,8 | 14,4 | 18,0 | 9,8 | 72,2 |
| Ceará | 13,5 | 20,3 | 13,4 | 66,1 | 12,5 | 15,1 | 10,8 | 74,1 |
| Rio Grande do Norte | 13,4 | 16,7 | 12,2 | 71,5 | 14,7 | 22,1 | 12,7 | 65,2 |
| Paraíba | 12,5 | 17,6 | 10,8 | 71,4 | 12,6 | 9,2 | 4,6 | 86,3 |
| Pernambuco | 13,9 | 17,4 | 13,9 | 68,5 | 13,3 | 13,0 | 9,3 | 77,7 |
| Alagoas | 23,2 | 22,1 | 9,8 | 67,9 | 22,2 | 16,3 | 10,6 | 73,1 |
| Sergipe | 14,1 | 14,3 | 13,2 | 72,4 | 17,9 | 15,1 | 12,6 | 72,2 |
| Bahia | 15,9 | 15,2 | 13,4 | 71,0 | 15,8 | 13,7 | 11,6 | 74,7 |
| Região Nordeste | 16,0 | 18,3 | 12,5 | 69,2 | 14,8 | 15,4 | 10,5 | 74,1 |
| Minas Gerais | 12,5 | 10,4 | 9,9 | 79,7 | 10,6 | 13,7 | 11,8 | 74,5 |
| Espírito Santo | 15,7 | 17,9 | 10,6 | 68,9 | 11,4 | 12,4 | 13,3 | 74,3 |
| Rio de Janeiro | 9,5 | 6,3 | 17,6 | 76,0 | 10,0 | 6,5 | 17,6 | 75,9 |
| São Paulo | 10,4 | 10,6 | 13,2 | 76,3 | 7,3 | 2,5 | 11,9 | 85,6 |
| Região Sudeste | 11,6 | 11,6 | 12,8 | 75,1 | 10,1 | 11,5 | 12,7 | 75,9 |
| Paraná | 12,6 | 8,9 | 15,5 | 75,5 | 11,5 | 8,2 | 10,5 | 81,3 |
| Santa Catarina | 8,6 | 10,1 | 15,1 | 73,4 | 6,8 | 6,7 | 20,0 | 73,3 |
| Rio Grande do Sul | 7,0 | 11,4 | 13,8 | 74,3 | 7,9 | 9,2 | 12,6 | 78,2 |
| Região Sul | 9,9 | 9,8 | 15,0 | 75,1 | 9,8 | 8,2 | 12,2 | 79,6 |
| Mato Grosso do Sul | 12,0 | 11,7 | 13,1 | 75,1 | 10,4 | 23,3 | 16,7 | 60,0 |
| Mato Grosso | 13,1 | 8,1 | 15,7 | 76,2 | 12,8 | 20,4 | 6,1 | 73,5 |
| Goiás | 10,4 | 14,6 | 17,5 | 67,6 | 10,1 | 4,5 | 13,5 | 82,0 |
| Distrito Federal | | | | | 13,0 | 6,9 | 17,2 | 75,9 |
| Região Centro-Oeste | 11,7 | 11,5 | 15,3 | 73,0 | 11,1 | 11,7 | 12,7 | 75,6 |
| Brasil | 15,9 | 17,5 | 14,1 | 68,3 | 13,1 | 14,0 | 11,4 | 74,6 |

Fonte: SIAB - Base limpa.


* MIP: % do total geral de óbitos, MIP diarreia, MIP IRA e MIP outras causas: % do total de óbitos < 1 ano.

Mortalidade infantil proporcional por diarreia, por IRA e por outras causas nas áreas cobertas pelo PACS, Brasil e regiões, 2000.



Fonte: SIAB - Base limpa.

Mortalidade infantil proporcional por diarreia, por IRA e por outras causas nas áreas cobertas pelo PSF, Brasil e regiões, 2000.




Fonte: SIAB - Base limpa.

Mortalidade infantil proporcional neonatal e pós-neonatal nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000.

| Estados | PACS | | PSF | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | Mortalidade infantil neonatal (%) | Mortalidade infantil pós-neonatal (%) | Mortalidade infantil neonatal (%) | Mortalidade infantil pós-neonatal (%) |
| Rondônia | 45,8 | 54,2 | 57,9 | 42,1 |
| Acre | 52,7 | 47,3 | 54,2 | 45,8 |
| Amazonas | 56,3 | 43,7 | 49,5 | 50,5 |
| Roraima | 37,3 | 62,7 | | |
| Pará | 46,6 | 53,4 | 51,9 | 48,1 |
| Amapá | 55,4 | 44,6 | 55,6 | 44,4 |
| Tocantins | 50,9 | 48,6 | 51,5 | 48,5 |
| Região Norte | 50,1 | 49,9 | 51,7 | 48,3 |
| Maranhão | 48,6 | 51,4 | 50,0 | 50,0 |
| Piauí | 52,0 | 48,0 | 55,9 | 44,1 |
| Ceará | 52,3 | 47,7 | 56,3 | 43,7 |
| Rio Grande do Norte | 46,8 | 53,2 | 57,4 | 42,6 |
| Paraíba | 48,1 | 51,9 | 53,6 | 46,4 |
| Pernambuco | 46,5 | 53,5 | 45,9 | 54,1 |
| Alagoas | 41,4 | 58,6 | 43,0 | 57,0 |
| Sergipe | 57,5 | 42,5 | 52,1 | 47,9 |
| Bahia | 49,2 | 50,8 | 49,8 | 50,2 |
| Região Nordeste | 48,8 | 51,2 | 51,3 | 48,7 |
| Minas Gerais | 45,0 | 55,0 | 49,0 | 51,0 |
| Espírito Santo | 53,7 | 46,3 | 53,1 | 46,9 |
| Rio de Janeiro | 55,2 | 44,8 | 50,2 | 49,8 |
| São Paulo | 57,8 | 42,2 | 60,2 | 39,8 |
| Região Sudeste | 53,4 | 46,6 | 50,6 | 49,4 |
| Paraná | 52,9 | 47,1 | 56,1 | 43,9 |
| Santa Catarina | 48,1 | 51,9 | 49,3 | 50,7 |
| Rio Grande do Sul | 60,3 | 39,7 | 69,0 | 31,0 |
| Região Sul | 54,9 | 45,1 | 57,3 | 42,7 |
| Mato Grosso do Sul | 48,4 | 51,6 | 66,7 | 33,3 |
| Mato Grosso | 55,3 | 44,7 | 51,0 | 49,0 |
| Goiás | 50,6 | 49,4 | 58,4 | 41,6 |
| Distrito Federal | | | 72,4 | 27,6 |
| Região Centro-Oeste | 51,2 | 48,8 | 59,9 | 40,1 |
| Brasil | 49,8 | 50,2 | 51,7 | 48,3 |


Fonte: SIAB - Base limpa.

Mortalidade infantil proporcional neonatal e pós-neonatal nas áreas cobertas pelo PACS, Brasil e regiões, 2000.



Fonte: SIAB - Base limpa.

Mortalidade infantil proporcional neonatal e pós-neonatal nas áreas cobertas pelo PSF, Brasil e regiões, 2000.




Fonte: SIAB - Base limpa.

Mortalidade proporcional de adolescentes (10 a 19 anos) por violência e de mulheres (10 a 49 anos) nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil, 2000.

| Estados | PACS | | PSF | |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | Óbitos adolescentes (%) | Óbitos mulheres (%) | Óbitos adolescentes (%) | Óbitos mulheres (%) |
| Rondônia | 2,2 | 11,0 | 0,4 | 12,1 |
| Acre | 1,6 | 12,4 | 0,6 | 11,8 |
| Amazonas | 2,9 | 8,8 | 1,1 | 9,7 |
| Roraima | 8,7 | 19,3 | 8,9 | 29,8 |
| Pará | 1,4 | 9,9 | 1,5 | 11,3 |
| Amapá | 3,7 | 14,1 | 3,6 | |
| Tocantins | 1,3 | 9,6 | 3,0 | 10,4 |
| Região Norte | 1,9 | 10,2 | 2,2 | 11,4 |
| Maranhão | 1,3 | 8,9 | 1,1 | 8,7 |
| Piauí | 1,1 | 6,4 | 1,7 | 7,2 |
| Ceará | 1,1 | 5,5 | 0,8 | 5,2 |
| Rio Grande do Norte | 2,1 | 9,2 | 1,2 | 5,6 |
| Paraíba | 1,4 | 6,3 | 1,4 | 6,3 |
| Pernambuco | 2,1 | 8,3 | 2,3 | 7,4 |
| Alagoas | 1,1 | 7,4 | 1,2 | 8,6 |
| Sergipe | 1,7 | 6,9 | 1,2 | 7,1 |
| Bahia | 1,8 | 7,4 | 1,6 | 8,6 |
| Região Nordeste | 1,7 | 7,6 | 1,3 | 6,6 |
| Minas Gerais | 3,3 | 7,5 | 1,5 | 7,9 |
| Espírito Santo | 0,9 | 8,5 | 1,7 | 7,7 |
| Rio de Janeiro | 2,0 | 10,6 | 2,2 | 9,4 |
| São Paulo | 2,4 | 8,1 | 1,3 | 7,3 |
| Região Sudeste | 2,2 | 8,7 | 1,6 | 8,0 |
| Paraná | 2,0 | 11,5 | 2,1 | 8,3 |
| Santa Catarina | 0,7 | 5,5 | 1,2 | 28,7 |
| Rio Grande do Sul | 1,5 | 5,5 | 1,4 | 8,7 |
| Região Sul | 1,7 | 8,5 | 1,8 | 12,6 |
| Mato Grosso do Sul | 1,4 | 9,0 | 1,0 | 9,3 |
| Mato Grosso | 2,8 | 8,4 | 1,3 | 11,0 |
| Goiás | 2,5 | 9,7 | 3,7 | 10,9 |
| Distrito Federal | | | 4,2 | 16,8 |
| Região Centro-Oeste | 2,2 | 9,1 | 2,9 | 11,4 |
| Brasil | 1,8 | 8,1 | 1,5 | 7,8 |


Fonte: SIAB - Base limpa.

Mortalidade proporcional de adolescentes (10 a 19 anos) por violência nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.



Fonte: SIAB - Base limpa.

Mortalidade proporcional de mulheres (10 a 49 anos) nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.



Fonte: SIAB - Base limpa.


Atenção à Saúde de Grupos de Risco – Menores de 2 Anos

Proporção de crianças até 4 meses com aleitamento materno exclusivo e crianças menores de 2 anos que tiveram diarreia e usaram terapia de hidratação/reidratação oral nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000.

| Estados | PACS | | PSF | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Crianças até 4 meses com aleitamento materno exclusivo (%) | Crianças < 2 anos que tiveram diarreia e usaram Terapia de hidratação/reidratação oral (%) | Crianças até 4 meses com aleitamento materno exclusivo (%) | Crianças < 2 anos que tiveram diarreia e usaram Terapia de hidratação/reidratação oral (%) |
| Rondônia | 76,0 | 77,0 | 74,7 | 71,0 |
| Acre | 58,0 | 76,4 | 64,7 | 80,6 |
| Amazonas | 65,8 | 75,8 | 66,2 | 72,1 |
| Roraima | 66,0 | 63,2 | 68,4 | 75,9 |
| Pará | 63,7 | 71,2 | 69,5 | 75,0 |
| Amapá | 67,5 | 64,1 | 71,6 | 77,7 |
| Tocantins | 65,4 | 82,0 | 70,5 | 80,4 |
| Região Norte | 65,0 | 72,3 | 69,8 | 76,5 |
| Maranhão | 52,5 | 79,9 | 61,7 | 88,9 |
| Piauí | 55,1 | 75,8 | 61,6 | 80,6 |
| Ceará | 56,6 | 88,5 | 60,3 | 90,3 |
| Rio Grande do Norte | 62,0 | 64,7 | 62,8 | 69,9 |
| Paraíba | 54,9 | 72,1 | 59,8 | 76,2 |
| Pernambuco | 52,4 | 70,2 | 55,2 | 76,7 |
| Alagoas | 47,7 | 73,0 | 53,1 | 79,2 |
| Sergipe | 55,8 | 72,9 | 52,9 | 79,0 |
| Bahia | 58,3 | 72,6 | 58,8 | 78,0 |
| Região Nordeste | 55,5 | 74,6 | 58,2 | 83,3 |
| Minas Gerais | 68,8 | 69,6 | 66,1 | 63,1 |
| Espirito Santo | 68,8 | 68,8 | 71,8 | 58,0 |
| Rio de Janeiro | 66,3 | 65,4 | 65,2 | 55,1 |
| São Paulo | 66,4 | 60,5 | 72,0 | 51,6 |
| Região Sudeste | 67,3 | 65,5 | 67,1 | 60,7 |
| Paraná | 73,1 | 61,0 | 74,4 | 53,0 |
| Santa Catarina | 68,3 | 49,9 | 71,3 | 60,1 |
| Rio Grande do Sul | 66,8 | 60,3 | 66,5 | 57,5 |
| Região Sul | 70,7 | 60,2 | 72,3 | 55,3 |
| Mato Grosso do Sul | 65,8 | 73,1 | 61,3 | 61,7 |
| Mato Grosso | 64,0 | 71,4 | 71,5 | 73,4 |
| Goiás | 70,2 | 71,3 | 70,1 | 90,9 |
| Distrito Federal | | | 84,1 | 78,6 |
| Região Centro-Oeste | 66,5 | 71,9 | 71,8 | 81,9 |
| Brasil | 59,8 | 72,9 | 62,5 | 77,7 |


Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de crianças até 4 meses com aleitamento materno exclusivo nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.



Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de crianças menores de 2 anos que tiveram diarreia e usaram terapia de hidratação/reidratação oral nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.




Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de nascidos vivos pesados ao nascer, de crianças menores de 1 ano e de 12 a 23 meses pesadas pelos agentes comunitários de saúde (ACS) nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000.

| Estados | PACS | | | PSF | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | RN pesados ao nascer (%) | Crianças < 1 ano pesadas pelos ACS (%) | Crianças de 12 a 23 meses pesadas pelos ACS (%) | RN pesados ao nascer (%) | Crianças < 1 ano pesadas pelos ACS (%) | Crianças de 12 a 23 meses pesadas pelos ACS (%) |
| Rondônia | 97,6 | 84,8 | 82,7 | 97,4 | 86,6 | 83,6 |
| Acre | 90,9 | 87,7 | 86,8 | 97,0 | 89,8 | 88,0 |
| Amazonas | 83,5 | 59,1 | 58,0 | 89,0 | 77,0 | 76,1 |
| Roraima | 96,7 | 77,4 | 78,2 | 97,5 | 81,5 | 78,8 |
| Pará | 88,1 | 72,2 | 70,3 | 95,4 | 75,7 | 73,2 |
| Amapá | 95,7 | 84,3 | 81,3 | 96,8 | 90,5 | 89,3 |
| Tocantins | 94,1 | 77,9 | 76,8 | 96,8 | 87,2 | 85,4 |
| Região Norte | 88,8 | 72,3 | 70,6 | 95,7 | 82,3 | 80,1 |
| Maranhão | 87,8 | 80,5 | 78,9 | 94,2 | 86,9 | 85,1 |
| Piauí | 94,6 | 85,8 | 84,2 | 96,5 | 87,7 | 86,2 |
| Ceará | 98,7 | 88,7 | 86,8 | 98,8 | 92,0 | 90,5 |
| Rio Grande do Norte | 95,5 | 78,3 | 76,0 | 95,9 | 77,2 | 74,3 |
| Paraíba | 97,6 | 78,3 | 76,2 | 88,6 | 83,7 | 81,8 |
| Pernambuco | 96,8 | 76,0 | 72,1 | 97,8 | 81,5 | 75,0 |
| Alagoas | 94,4 | 80,3 | 79,1 | 95,6 | 80,4 | 78,8 |
| Sergipe | 97,8 | 91,6 | 89,9 | 97,7 | 90,8 | 89,4 |
| Bahia | 92,9 | 85,1 | 83,9 | 95,0 | 75,2 | 73,1 |
| Região Nordeste | 93,8 | 82,2 | 80,1 | 97,2 | 86,3 | 83,8 |
| Minas Gerais | 95,3 | 69,5 | 66,1 | 94,8 | 77,8 | 72,9 |
| Espírito Santo | 95,9 | 73,1 | 71,1 | 95,8 | 74,6 | 72,0 |
| Rio de Janeiro | 97,8 | 86,1 | 85,3 | 96,3 | 78,8 | 75,4 |
| São Paulo | 97,3 | 79,3 | 72,4 | 97,4 | 82,0 | 77,7 |
| Região Sudeste | 96,7 | 77,6 | 73,7 | 95,5 | 78,3 | 73,9 |
| Paraná | 96,7 | 79,9 | 74,9 | 97,6 | 78,0 | 71,9 |
| Santa Catarina | 97,1 | 71,4 | 65,5 | 98,0 | 76,4 | 70,2 |
| Rio Grande do Sul | 97,4 | 78,7 | 75,6 | 98,7 | 78,4 | 67,9 |
| Região Sul | 97,0 | 79,0 | 74,6 | 97,9 | 77,7 | 70,7 |
| Mato Grosso do Sul | 96,0 | 68,2 | 65,7 | 94,7 | 55,4 | 52,7 |
| Mato Grosso | 97,6 | 80,0 | 75,8 | 99,0 | 78,2 | 76,8 |
| Goiás | 95,6 | 80,6 | 77,6 | 123,1 | 81,8 | 82,1 |
| Distrito Federal | | | | 99,5 | 74,5 | 68,6 |
| Região Centro-Oeste | 96,5 | 75,6 | 72,4 | 110,2 | 76,5 | 74,5 |
| Brasil | 93,6 | 79,6 | 77,2 | 97,2 | 83,3 | 80,0 |


Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de nascidos vivos pesados ao nascer nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.




Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de crianças menores de 1 ano pesadas pelos ACS nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.



Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de crianças de 12 a 23 meses pesadas pelos ACS nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.



Fonte: SIAB - Base limpa.


Proporção de crianças menores de 1 ano e de 12 a 23 meses com esquema vacinal básico em dia* nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000.

| Estados | PACS | | PSF | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | Crianças < 1 ano com esquema vacinal básico em dia (%) | Crianças de 12 a 23 meses com esquema vacinal básico em dia (%) | Crianças < 1 ano com esquema vacinal básico em dia (%) | Crianças de 12 a 23 meses com esquema vacinal básico em dia (%) |
| Rondônia | 90,1 | 91,7 | 90,7 | 93,3 |
| Acre | 65,9 | 69,4 | 79,7 | 81,5 |
| Amazonas | 71,8 | 72,6 | 74,6 | 79,2 |
| Roraima | 87,3 | 87,5 | | 88,0 |
| Pará | 72,9 | 75,3 | 80,7 | 82,7 |
| Amapá | 87,2 | 87,4 | 87,0 | 87,6 |
| Tocantins | 86,9 | 89,1 | 93,4 | 94,8 |
| Região Norte | 75,6 | 77,5 | 86,1 | 87,9 |
| Maranhão | 62,7 | 70,8 | 74,4 | 80,4 |
| Piauí | 76,5 | 84,0 | 82,9 | 86,9 |
| Ceará | 79,5 | 85,1 | 88,2 | 92,5 |
| Rio Grande do Norte | 81,8 | 83,8 | 84,6 | 86,6 |
| Paraíba | 79,7 | 84,2 | 83,5 | 87,4 |
| Pernambuco | 86,1 | 88,0 | 87,5 | 89,6 |
| Alagoas | 74,8 | 78,0 | 80,5 | 84,5 |
| Sergipe | 79,8 | 86,0 | 83,0 | 90,3 |
| Bahia | 74,5 | 79,2 | 76,7 | 80,6 |
| Região Nordeste | 75,8 | 80,7 | 85,0 | 88,8 |
| Minas Gerais | 90,3 | 90,7 | 91,8 | 90,7 |
| Espírito Santo | 93,2 | 94,4 | 93,8 | 94,3 |
| Rio de Janeiro | 92,4 | 92,4 | 90,7 | 89,6 |
| São Paulo | 92,9 | 93,8 | 94,9 | 95,1 |
| Região Sudeste | 92,4 | 93,0 | 92,2 | 91,4 |
| Paraná | 90,9 | 91,3 | 93,2 | 93,0 |
| Santa Catarina | 93,0 | 94,4 | 84,5 | 84,1 |
| Rio Grande do Sul | 88,4 | 91,3 | 87,3 | 88,2 |
| Região Sul | 90,1 | 91,5 | 90,0 | 90,0 |
| Mato Grosso do Sul | 83,9 | 84,2 | 84,3 | 82,6 |
| Mato Grosso | 89,6 | 88,3 | 88,5 | 90,1 |
| Goiás | 87,1 | 88,8 | 86,8 | 90,7 |
| Distrito Federal | | | 93,3 | 94,0 |
| Região Centro-Oeste | 86,7 | 86,9 | 87,9 | 90,1 |
| Brasil | 78,3 | 81,9 | 87,1 | 89,5 |

Fonte: SIAB.


* Para o SIAB, crianças com vacina em dia são aquelas que receberam as doses das vacinas previstas para sua idade, segundo o esquema básico de vacinação.

Proporção de crianças menores de 1 ano com esquema vacinal básico em dia nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.



Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de crianças de 12 a 23 meses com esquema vacinal básico em dia nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.



Fonte: SIAB - Base limpa.


Atenção à Saúde de Grupos de Risco – Gestantes

Proporção de gestantes com consultas pré-natal no mês, com início do pré-natal no primeiro trimestre e com vacina em dia nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000.

| Estados | PACS | | | | PSF | |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | Gestante com consulta de pré-natal no mês (%) | Gestante com início do pré-natal no 1º trimestre (%) | Gestante com vacina em dia (%) | Gestante com consulta de pré-natal no mês (%) | Gestante com início do pré-natal no 1º trimestre (%) | Gestante com vacina em dia (%) |
| Rondônia | 78,4 | 61,0 | 89,3 | 85,3 | 66,3 | 90,1 |
| Acre | 62,9 | 38,0 | 71,0 | 78,9 | 40,6 | 86,7 |
| Amazonas | 58,3 | 35,9 | 69,2 | 68,4 | 40,2 | 76,8 |
| Roraima | 77,9 | 56,9 | 87,4 | - | - | - |
| Pará | 61,4 | 41,0 | 76,9 | 75,8 | 53,0 | 85,8 |
| Amapá | 70,1 | 55,3 | 81,9 | 59,8 | 48,6 | 73,7 |
| Tocantins | 71,2 | 58,9 | 87,7 | 80,8 | 66,6 | 91,0 |
| Região Norte | 63,7 | 44,1 | 77,7 | 77,5 | 58,4 | 87,1 |
| Maranhão | 55,5 | 41,2 | 74,1 | 66,9 | 48,4 | 80,3 |
| Piauí | 63,8 | 45,9 | 86,0 | 76,3 | 57,3 | 89,9 |
| Ceará | 80,3 | 56,0 | 89,7 | 88,5 | 63,9 | 94,8 |
| Rio Grande do Norte | 79,3 | 59,5 | 84,2 | 84,3 | 63,4 | 88,2 |
| Paraíba | 76,0 | 56,9 | 83,6 | 84,2 | 63,8 | 88,5 |
| Pernambuco | 78,3 | 54,9 | 86,9 | 82,9 | 60,3 | 90,4 |
| Alagoas | 57,7 | 39,2 | 73,0 | 70,6 | 48,2 | 81,1 |
| Sergipe | 72,0 | 60,7 | 83,0 | 78,0 | 62,4 | 87,4 |
| Bahia | 65,8 | 44,0 | 77,6 | 77,3 | 52,0 | 79,0 |
| Região Nordeste | 68,6 | 48,8 | 80,8 | 82,0 | 59,3 | 89,7 |
| Minas Gerais | 81,3 | 57,9 | 89,0 | 89,2 | 69,3 | 91,4 |
| Espírito Santo | 83,8 | 62,7 | 83,5 | 89,8 | 72,7 | 90,7 |
| Rio de Janeiro | 87,7 | 65,9 | 78,8 | 88,0 | 66,2 | 81,6 |
| São Paulo | 84,6 | 63,9 | 80,2 | 89,9 | 74,1 | 89,1 |
| Região Sudeste | 84,3 | 62,9 | 82,3 | 89,2 | 70,0 | 89,8 |
| Paraná | 87,5 | 63,0 | 87,1 | 91,2 | 66,1 | 90,8 |
| Santa Catarina | 86,5 | 65,9 | 80,6 | 86,1 | 68,7 | 80,6 |
| Rio Grande do Sul | 85,8 | 69,7 | 80,7 | 89,4 | 72,0 | 89,4 |
| Região Sul | 86,8 | 65,6 | 84,4 | 89,7 | 67,9 | 88,3 |
| Mato Grosso do Sul | 87,5 | 69,1 | 83,8 | 87,4 | 68,8 | 85,1 |
| Mato Grosso | 87,6 | 65,9 | 90,7 | 91,9 | 69,6 | 92,0 |
| Goiás | 82,1 | 66,7 | 88,4 | 87,8 | 75,3 | 94,9 |
| Distrito Federal | | | | 80,6 | 58,2 | 94,7 |
| Região Centro-Oeste | 85,9 | 67,3 | 87,5 | 87,2 | 70,1 | 93,0 |
| Brasil | 71,1 | 51,2 | 81,0 | 84,0 | 62,4 | 89,6 |


Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de gestantes com consulta de pré-natal no mês nas áreas cobertas por PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.




Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de gestantes com início do pré-natal no primeiro trimestre nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.



Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de gestantes com vacina em dia nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.



Fonte: SIAB - Base limpa.


Atenção à Saúde de Grupos de Risco – Acompanhamento de Problemas de Saúde Prioritários

**Proporção de portadores de hipertensão arterial, diabetes *mellitus*,
tuberculose e hanseníase acompanhados nas áreas cobertas
pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000.**

| Estados | PACS | | | | PSF | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | Portadores de hipertensão | Portadores de diabetes | Portadores de hanseníase | Portadores de tuberculose | Portadores de hipertensão | Portadores de diabetes | Portadores de hanseníase | Portadores de tuberculose |
| | acompanhados (%) | acompanhados (%) | acompanhados (%) | acompanhados (%) | acompanhados (%) | acompanhados (%) | acompanhados (%) | acompanhados (%) |
| Rondônia | 91,2 | 95,3 | 96,5 | 92,2 | 91,7 | 93,6 | 93,6 | 94,2 |
| Acre | 90,0 | 93,6 | 91,5 | 88,9 | 83,0 | 93,1 | 89,1 | 99,1 |
| Amazonas | 94,2 | 94,5 | 91,9 | 82,2 | 94,7 | 95,5 | 97,0 | 94,5 |
| Roraima | 95,6 | 95,8 | 94,9 | 92,5 | 93,3 | 94,6 | 96,7 | 85,7 |
| Pará | 89,6 | 92,0 | 94,3 | 89,4 | 85,0 | 86,7 | 92,9 | 80,5 |
| Amapá | 89,6 | 96,6 | 93,0 | 88,1 | 97,8 | 97,5 | 93,3 | 64,3 |
| Tocantins | 90,0 | 94,0 | 96,4 | 91,1 | 93,7 | 93,6 | 97,0 | 96,8 |
| Região Norte | 90,6 | 93,4 | 94,2 | 87,4 | 90,9 | 91,3 | 95,0 | 87,5 |
| Maranhão | 94,3 | 96,2 | 95,5 | 93,2 | 94,6 | 93,0 | 95,6 | 95,2 |
| Piauí | 93,6 | 93,3 | 94,0 | 88,1 | 91,5 | 96,0 | 95,9 | 94,2 |
| Ceará | 89,1 | 90,4 | 93,4 | 88,9 | 92,5 | 93,6 | 95,6 | 92,9 |
| Rio Grande do Norte | 87,0 | 88,8 | 94,3 | 81,3 | 90,1 | 92,3 | 96,0 | 91,5 |
| Paraíba | 88,6 | 91,5 | 97,0 | 88,5 | 88,5 | 91,0 | 94,1 | 93,0 |
| Pernambuco | 82,6 | 88,2 | 92,9 | 90,9 | 83,5 | 88,3 | 90,4 | 86,1 |
| Alagoas | 92,8 | 93,8 | 98,5 | 97,7 | 94,5 | 96,2 | 93,7 | 92,2 |
| Sergipe | 90,4 | 94,3 | 95,0 | 91,4 | 93,7 | 95,1 | 98,1 | 94,2 |
| Bahia | 88,3 | 91,2 | 91,2 | 88,7 | 89,2 | 92,4 | 86,5 | 86,1 |
| Região Nordeste | 88,0 | 91,1 | 94,3 | 89,7 | 90,4 | 92,8 | 94,1 | 91,3 |
| Minas Gerais | 77,4 | 68,2 | 91,7 | 84,6 | 84,6 | 88,4 | 93,9 | 89,0 |
| Espírito Santo | 81,9 | 87,9 | 91,4 | 94,6 | 86,9 | 87,0 | 92,5 | 83,1 |
| Rio de Janeiro | 87,6 | 89,4 | 93,3 | 86,6 | 83,7 | 86,5 | 93,2 | 85,4 |
| São Paulo | 84,7 | 85,3 | 92,5 | 88,2 | 82,6 | 84,7 | 90,5 | 92,9 |
| Região Sudeste | 83,6 | 83,9 | 92,2 | 88,4 | 84,3 | 87,3 | 93,4 | 88,7 |
| Paraná | 83,0 | 85,2 | 84,0 | 89,0 | 74,6 | 86,4 | 92,7 | 78,8 |
| Santa Catarina | 88,2 | 88,6 | 92,0 | 87,7 | 72,4 | 30,4 | 96,2 | 83,5 |
| Rio Grande do Sul | 68,5 | 74,9 | 85,8 | 77,5 | 70,1 | 75,6 | 76,9 | 85,5 |
| Região Sul | 77,1 | 81,4 | 84,3 | 85,0 | 73,4 | 61,9 | 92,4 | 81,6 |
| Mato Grosso do Sul | 79,6 | 82,3 | 89,1 | 83,1 | 87,8 | 89,2 | 91,8 | 79,7 |
| Mato Grosso | 92,7 | 93,4 | 96,7 | 90,6 | 93,3 | 94,0 | 94,8 | 96,1 |
| Goiás | 86,6 | 89,7 | 92,2 | 84,4 | 94,2 | 95,3 | 92,6 | 85,3 |
| Distrito Federal | | | | | 69,7 | 79,0 | 85,8 | 93,3 |
| Região Centro-Oeste | 85,0 | 87,1 | 93,9 | 86,8 | 88,0 | 91,0 | 92,8 | 88,3 |
| Brasil | 85,5 | 88,7 | 93,4 | 88,6 | 86,0 | 86,5 | 93,9 | 89,4 |


Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de portadores de hipertensão arterial acompanhados nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.




Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de portadores de diabetes *mellitus* acompanhados nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.




Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de portadores de hanseníase acompanhados nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.



Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de portadores de tuberculose acompanhados nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.



Fonte: SIAB - Base limpa.


Acompanhamento de Hospitalizações

Proporção de hospitalizações por pneumonia e desidratação em menores de 5 anos, por complicações de diabetes *mellitus*, abuso de álcool e outras causas nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, por estado e região, Brasil, 2000.

| Estados | PACS | | | | | PSF | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| | Hospitalização de menor de 5 anos por pneumonia (%) | Hospitalização de menor de 5 anos por desidratação (%) | Hospitalização por complicações de diabetes (%) | Hospitalização por abuso de álcool (%) | Hospitalização por outras causas (%) | Hospitalização de menor de 5 anos por pneumonia (%) | Hospitalização de menor de 5 anos por desidratação (%) | Hospitalização por complicações de diabetes (%) | Hospitalização por abuso de álcool (%) | Hospitalização por outras causas (%) |
| Rondônia | 8,9 | 8,2 | 3,0 | 2,0 | 77,9 | 9,7 | 8,0 | 3,4 | 0,9 | 78,0 |
| Acre | 26,7 | 14,5 | 4,7 | 1,9 | 52,3 | 12,2 | 10,9 | 2,2 | 1,2 | 73,5 |
| Amazonas | 9,2 | 10,2 | 6,5 | 2,9 | 71,2 | 7,4 | 7,1 | 3,1 | 1,1 | 81,2 |
| Roraima | 22,6 | 8,1 | 6,6 | 1,6 | 61,0 | 43,9 | 7,0 | 4,3 | 2,9 | 42,0 |
| Pará | 10,1 | 9,9 | 3,2 | 1,2 | 75,7 | 11,5 | 7,8 | 3,9 | 1,6 | 75,2 |
| Amapá | 11,2 | 9,9 | 6,9 | 2,2 | 69,8 | 8,9 | 5,5 | 3,8 | | 81,8 |
| Tocantins | 12,9 | 6,9 | 3,1 | 1,2 | 75,9 | 10,6 | 6,8 | 3,1 | 1,5 | 77,9 |
| Região Norte | 11,1 | 9,4 | 4,0 | 1,6 | 73,9 | 11,2 | 7,4 | 3,3 | 1,4 | 76,7 |
| Maranhão | 12,4 | 8,6 | 2,4 | 0,8 | 75,8 | 13,9 | 8,3 | 2,0 | 0,6 | 75,2 |
| Piauí | 12,5 | 8,0 | 1,8 | 1,1 | 76,5 | 11,6 | 6,4 | 2,0 | 1,2 | 78,7 |
| Ceará | 11,5 | 7,5 | 1,9 | 1,0 | 78,1 | 10,8 | 6,4 | 2,0 | 1,1 | 79,8 |
| Rio Grande do Norte | 9,6 | 6,1 | 3,3 | 2,0 | 79,0 | 10,4 | 5,9 | 3,0 | 1,5 | 79,3 |
| Paraíba | 8,7 | 5,8 | 3,1 | 1,2 | 81,1 | 8,9 | 4,8 | 2,0 | 0,9 | 83,5 |
| Pernambuco | 10,0 | 6,7 | 4,0 | 1,7 | 77,6 | 8,7 | 4,4 | 4,3 | 1,4 | 81,3 |
| Alagoas | 7,5 | 5,5 | 2,6 | 0,8 | 83,6 | 8,6 | 5,4 | 2,6 | 1,0 | 82,5 |
| Sergipe | 12,6 | 4,8 | 4,1 | 1,0 | 77,5 | 13,7 | 5,4 | 4,2 | 2,0 | 74,8 |
| Bahia | 6,7 | 6,0 | 3,7 | 1,7 | 81,9 | 9,7 | 5,6 | 2,8 | 1,0 | 80,9 |
| Região Nordeste | 9,2 | 6,7 | 3,2 | 1,4 | 79,5 | 10,4 | 5,9 | 2,5 | 1,1 | 80,1 |
| Minas Gerais | 11,3 | 7,7 | 5,8 | 4,2 | 70,9 | 7,2 | 4,0 | 4,4 | 2,9 | 81,5 |
| Espírito Santo | 10,9 | 5,2 | 4,8 | 2,6 | 76,6 | 6,3 | 3,2 | 4,4 | 1,8 | 84,3 |
| Rio de Janeiro | 9,7 | 3,6 | 5,9 | 3,8 | 76,9 | 9,5 | 3,0 | 7,7 | 4,2 | 75,5 |
| São Paulo | 10,5 | 3,8 | 5,3 | 3,4 | 77,0 | 6,9 | 2,8 | 3,7 | 2,7 | 83,9 |
| Região Sudeste | 10,5 | 4,8 | 5,4 | 3,5 | 75,8 | 7,3 | 3,7 | 4,6 | 2,9 | 81,5 |
| Paraná | 9,5 | 4,9 | 4,9 | 3,4 | 77,3 | 7,6 | 3,5 | 4,3 | 3,3 | 81,3 |
| Santa Catarina | 6,8 | 3,3 | 4,8 | 2,1 | 82,9 | 8,0 | 3,3 | 3,4 | 1,1 | 84,2 |
| Rio Grande do Sul | 8,0 | 3,1 | 4,2 | 1,6 | 83,2 | 7,9 | 3,3 | 4,0 | 1,5 | 83,3 |
| Região Sul | 8,5 | 3,8 | 4,5 | 2,3 | 80,8 | 7,8 | 3,4 | 4,1 | 2,4 | 82,3 |
| Mato Grosso do Sul | 7,3 | 3,4 | 3,5 | 0,9 | 84,8 | 8,8 | 3,1 | 1,8 | 1,0 | 85,3 |
| Mato Grosso | 34,3 | 3,1 | 2,0 | 0,5 | 60,1 | 7,5 | 4,1 | 1,8 | 1,2 | 85,3 |
| Goiás | 7,5 | 5,6 | 4,9 | 2,7 | 79,4 | 8,5 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 83,5 |
| Distrito Federal | | | | | | 12,8 | 7,2 | 5,1 | 2,1 | 72,7 |
| Região Centro-Oeste | 18,7 | 3,9 | 3,3 | 1,3 | 72,9 | 8,6 | 4,1 | 2,5 | 1,4 | 83,4 |
| Brasil | 10,4 | 6,1 | 3,7 | 1,7 | 78,2 | 9,2 | 5,0 | 3,3 | 1,8 | 80,7 |


Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de hospitalizações de menores de 5 anos por pneumonia, nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.




Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de hospitalizações de menores de 5 anos por desidratação nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.




Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de hospitalizações por complicações de diabetes *mellitus* nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.




Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de hospitalizações por abuso de álcool nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.



Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de hospitalizações por outras causas nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, Brasil e regiões, 2000.



Fonte: SIAB - Base limpa.



EDITORA MS

Coordenação-Geral de Documentação e Informação/SAA/SE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

(Revisão, editoração, normalização, impressão e acabamento)

SIA, Trecho 4, Lotes 540/610 – CEP 71200-040

Telefone: (61) 233-2020 Fax: (61) 233-9558

E-mail: editora.ms@saude.gov.br

Brasília – DF, julho de 2003

OS 0793/2003